

Avertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL : 150 F Régisseur Recettes D.R.A.F. CCP DIJON 35 00 28 0



☎ 80.22.19.38

EDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 17 - 28 Juin 1988

MAIS :

Protection contre les pyrales

MAIS

L'évolution très rapide des cultures se poursuit.

Stades : très variables, quelques situations avoisinent le stade "panicule visible au fond du corset" alors que d'autres sont à moins de 5-6 feuilles. De nombreuses situations atteignent 1 m à 1,1 m.

PUCERONS

On observe essentiellement Metopolophium dirhodum et Sitobion avenae, avec parfois quelques individus de Rhopalosiphum padi. Malgré une certaine progression des populations, l'infestation reste faible et ne justifie pas d'intervention.

PYRALE

SITUATION :

La précocité du vol se confirme. Les premières pontes ont été observées en zones précoces et moyennes. Les premières éclosions sont imminentes dans l'Yonne.

PRECONISATIONS :

- zones précoces (Nord de l'Yonne)
intervention dès la fin de cette semaine, du 30 juin au 7 juillet.
- zones de précocité moyenne (secteurs plaine de Jura, Côte d'Or, Haute-Saône, Saône et Loire, Nièvre)
intervention du 4 au 9 juillet.
- zones tardives (Doubs, secteurs de plateaux)
intervention à prévoir du 11 au 16 juillet.

RAPPELS :

- le dépôt des pontes est possible sur des maïs encore peu développés,

P. 76

- pour les applications sous forme de granulés, une bonne rétention de produit n'est possible que si le maïs a au moins atteint le stade 8 feuilles. Avant ce stade, préférer une application liquide.

- l'utilisation de pyréthrinoides liquides s'accompagne d'un risque de pullulation ultérieure de pucerons (voir bulletin n° 7 du 13 avril dernier).

CULTURES LEGUMIERES

— MILDIOU DE L'OIGNON

Poursuivre les traitements, les risques étant toujours importants.

— MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Des attaques graves sont observées dans de nombreuses parcelles. Il est impératif de continuer à effectuer une couverture fongicide soigneuse des cultures comme il a été indiqué dans les bulletins précédents. En raison des risques, resserrer les cadences de traitement en utilisant des produits performants.

*

*

*

POUR LES AVERTISSEMENTS AGRICOLES
PAR TELEMATIQUE APPELEZ
36.17 Code AVERT